



Legenda:



Bestaande bomen. te handhaven, diverse soorten waaronder Juglans regia - Walnoot, Fraxinus excelsior - Gewone Es, Pyrus, Tilia cordata - Winterlide (leibomen) en diverse fruitbomen,



Nieuwe bomen. Nieuw te planten boom, solitair, inheemse soort;




B1 *knot* Salix alba - Schietwilg, mt 12-14 2 st.



B2 Fraxinus excelsior- Gewone es, mt 18-20 4 st.



B3 Alnus glutinosa - Gewone els, mt 12-14 4 st.




Nieuwe fruitbomen, Nieuw te planten fruitboom, solitair, inheemse soort;



B4 Prunus 'Mirabelle de Nancy' - Pruim, mt 16-18 4 st.



Bloemrijk grasland, Nieuw te zaaien
G1 Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden (Cruydhoeke)



Gazon, Nieuw in te zaaien



Bestaande haag

H1 Ilex aquifolium, met delen Carpinus betulus en Fagus sylvatica


H2 Ligustrum ovalifolium

H3 Ilex aquifolium met Carpinus betulus

H4 Ilex aquifolium met Carpinus betulus

H5 Crataegus monogyna

H6 Ilex aquifolium en Taxus baccata



Nieuwe kniphaag laag, bestaande uit; Carpinus betulus (Haagbeuk) (100%).
Leverantiemaat: 60-80 wortelgoed. Lengte:96m1, breedte tot ca. 0.50m
à 6 planten per m1, totaal; 576 stuks

*= afgestemd op afmetingen leverbare soort- en leverancier.

Beheerinstructies:

Bomen: De bomen (die op locaties staan waar mensen komen) dienen eens in de 3 jaar gecontroleerd te worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden.

Knotbomen: Tussen half november en maart knotten. Frequentie is afhankelijk van gewenste takdikte. Aan te raden is ieder jaar tot 1x per 3 jaar.

Fruitbomen: De fruitbomen dienen jaarlijks gesnoeid te worden om nieuwe vruchtdracht te stimuleren, maar ook om zieke takken en jonge, misplaatste scheuten te verwijderen.

Bosplantsoen: dient minimaal eens in de 5 jaar teruggesnoeid te worden tot een hoogte van ca. 1.00m. Dit kan uitgevoerd worden in de wintermaanden. Verder dient de struweel onkruidvrij gehouden te worden door middel van een bosmaaier. Het struweel biedt voldoende nest/voedervoorzieningen voor vogels.

Kniphaag: De kniphaag dient maximaal twee maal per jaar geschoren te worden, de eerste keer dient gedaan te zijn vóór de langste dag (21 juni) en de tweede knipbeurt vindt plaats rond augustus tot midden september.



Wadi
W1 Wadimengsel voor lichtere grond (Cruydhoeke)

0	07-12-2022		LBRI	--COLBRI--	PV	--BSPV--	RVHE	--LBRIE--
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.

BP Vlijmense Dijk 67, Vlijmen

Onderdeel

Landschappelijk inpassingsplan

Opdrachtgever

Woonveste

Fase

Status

Projectnummer

VKL207

Formaat

A2

Tekeningnummer

2022-2527

Schaal

1:500

Behorende bij doc. nr.

-

Roermond

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch

Hinham 152-E, 5246 AK Rosmalen

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333

info@kragten.nl

www.kragten.nl



0 5 10 15 20m

1:500



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m



